SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Stresnil 40 mg/ml injekčný roztok pre ošípané

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml obsahuje:
Účinná látka:
Azaperonum 40 mg

Pomocné látky:
Metylparabén (E218) 0,5 mg
Propylaparabén (E 216) 0,05 mg

Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.
Číry, bledožltý až žltý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cieľový druh

Ošípané.

4.2 Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov

1. Zvládnutie stresu
- prevencia a zvládnutie agresivity po zoskupení
- zvládnutie agresivity u prasníc

2. Na liečbu rôznych stavov podobných stresu
- pri srdcovej záťaži
- pri transportnej záťaži

3. Pôrodníctvo
- prerušenie pôrodu spôsobené excitáciou
- pomoc pri pôrode (manuálny pôrod)
- pri náprave inversio vaginae alebo prolapsus uteri
- zosilnené kontrakcie

4. Premedikácia pri lokálnej alebo celkovej anestézii

4.3 Kontraindikácie

Z dôvodu možného výskytu rezíduí v tkanivách, Stresnil je kontraindikovaný pri transporte alebo zoskupovaní ošípaných, ktoré by mali byť porazené skôr ako 18 dní po aplikácii.

Vyhýbať sa aplikácii lieku za veľmi chladných podmienok, pretože je možné riziko kardiovaskulárneho kolapsu spôsobené periférnou vazodilatáciou.

4.4 Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Nie sú.

4.5 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Pri všetkých indikáciách aplikovať prísne intramuskulárne v oblasti za uchom. Použiť dlhú hypodermickú ihlu a podľa možnosti aplikovať tesne za uchom, kolmo na kožu. Ak sa u veľkých zvierat použije krátka ihla, existuje riziko, že sa liek dostane iba do tuku. V takýchto prípadoch účinok môže byť nedostatočný. Po injekcii, počas indukčnej doby, zvieratá ustajniť na pokojnom mieste. Ak sú zvieratá počas indukčnej doby vyrušované alebo naháňané, účinok môže byť nedostatočný.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Ľudia so známou precitlivenosťou na azaperón sa musia vyhýbať kontaktu s týmto veterinárnym liekom. Stresnil, rovnako ako ostatné butyrofenóny, spôsobuje sedáciu človeka. Preto pri jeho aplikácii postupovať veľmi opatrne, aby nedošlo k injikovaniu osôb. Pri náhodnej injekcii vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi ukázať písomnú informáciu alebo obal.
V prípade zasiahnutia kože alebo očí, exponované miesto ihneď umyť vodou.
Ak sa po kontakte s liekom vyvinú symptómy ako začervenanie kože, opuch pier, tváre a očí alebo sťažené dýchanie ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu alebo obal lekárovi.
Po manipulácii s liekom si umyť ruky.

Iné bezpečnostné opatrenia

Nie sú.

4.6 Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)

Stresnil je bezpečný a veľmi dobre znášaný. Pri vysokých dávkach sa môže vyskytnúť slinenie a ťažké dýchanie. Tieto nežiaduce účinky odznejú spontánne a nespôsobujú ďalšie poškodenie. U kancov neprekročiť dávku 1 mg/kg ž. hm, pretože predávkovanie môže spôsobiť uvoľnenie penisu, ktoré môže mať za následok jeho poškodenie.

4.7 Použitie počas gravidity, laktácie

Stresnil sa môže bez rizika podávať gravidným zvieratám a zvieratám v laktácii.

4.8 Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Ak sa Stresnil podáva v kombinácii s inými injekčnými liekmi, nemiešať v jednej striekačke.

4.9 Dávkovanie a spôsob podania lieku

Agresivita
1. Prevencia a kontrola agresivity, bojovnosť pri preskupovaní:
Dávka: 2 mg/kg ž.hm. (1 ml/20 kg)

Prevencia agresivity pri preskupovaní
Ošípané z rôznych vrhov alebo kotercov sa môžu zoskupiť do jedného koterca hneď po injekcii Stresnilu. Po niekoľkých minútach si spoločne líhajú približne na 2 hodiny, bez ohľadu na ich pôvod. Neskôr, po vymiznutí účinku Stresnilu, výskyt bojovnosti nie je pravdepodobný. Liečiť by sa mali všetky zvieratá v skupine. Rešpektovať indikovanú dávku. Ak je dávka príliš nízka, zviera je upokojené, ale agresivita je potlačená len dočasne alebo vôbec. Ak je dávka príliš vysoká, zvieratá sa po precitnutí môžu dostať do stavu nebezpečnej bojovnosti. V deň liečby neošetrené zvieratá nevypúšťať do výbehu. Odstaveným prasiatkam sa môže Stresnil podávať pri naskladnení do výkrmu.
Liečebné použitie
Krátko po injekcii Stresnilu bojovné zvieratá sa upokoja. Zostávajú pokojné aj potom, keď sa účinok lieku vytráca. Nekastrované kance ostávajú po vymiznutí účinku Stresnilu aj naďalej o niečo agresívnejšie.

2. Agresívne prasnice
Dávka: 2 mg/kg ž.hm. (1 ml/20 kg)
Prasnica, ktorá nechce prijať novo narodené prasiatka alebo ich hryzie, začína ich akceptovať ½ -1 hodinu po liečbe. K aplikácii je nutné pristupovať opatrne, aby sa prasnica nevystrašila. Rešpektovať indikovanú dávku. Ak je dávka príliš nízka, sedácia je len dočasná. Ak je dávka príliš vysoká, po vymiznutí účinku Stresnilu môžu zvieratá znovu upadnúť do útlmu.

Stres
1. Záťaž srdca
Dávka: 0,4 mg/kg ž.hm. (1 ml/100 kg)
Zviera je upokojené do niekoľkých minút po injekcii. Chvenie sa zmenšuje a dýchanie prehlbuje. Cyanóza postupne mizne a frekvencia pulzu klesá. V prípade nedostatočného výsledku po 15 minútach sa môže podať druhá dávka. Je dôležité liečiť zvieratá ihneď po spozorovaní prvých klinických príznakov (napr. zrýchlené dýchanie).

2. Preprava
- Preprava prasiatok
Dávka: 0,4 – 2 mg/kg ž.hm. (1 ml/100 kg – 1 ml/20 kg)
Dávka 0,4 mg/kg podaná 15 – 30 minút pred transportom znižuje mortalitu a straty hmotnosti počas transportu. Dávka zvýšená na 2 mg/kg je prevenciou bojovnosti počas transportu. Zvieratá musia mať dosť miesta na ležanie a prevozné auto musí mať dostatočnú ventiláciu. Po injekcii zostávajú zvieratá ospalé 2 – 3 hodiny.

- Preprava kancov
Dávka: 1 mg/kg ž.hm. (0,5 ml/20 kg)
Injekciu aplikovať 15 – 30 minút pred nakladaním. Počas indukčnej doby zvieratá držať oddelene v pokojnom prostredí. Po injekcii zostávajú zvieratá ospalé 2 – 3 hodiny. Neprekročiť dávku 1 mg/kg ž.hm. Predávkovanie môže spôsobiť uvoľnenie penisu, ktoré môže mať za následok jeho poškodenie.

Pôrodníctvo
Dávka: 2 mg/kg ž.hm. (1 ml/20 kg)
- prerušenie pôrodu spôsobené excitáciou
- pomoc pri pôrode (manuálny pôrod)
- počas korekcie inversio vaginae alebo prolapsus uteri
- zosilnené kontrakcie

Premedikácia anestézie
Dávka: 1 – 2 mg/kg ž. hm. i.m. (0,5 – 1 ml/20 kg)
Stresnil v kombinácii s hypnotikami navodzuje stav celkovej anestézie, čo umožňuje vykonanie takmer väčšiny chirurgických zákrokov (diagnostické skúšky, kastrácia, kryptorchizmus, ingviálna alebo umbilikálna hernia, prolaps rekta a cisársky rez).

Spôsob podania: intramuskulárne
Pri všetkých indikáciách aplikovať prísne intramuskulárne v oblasti za uchom. Použiť dlhú hypodermickú ihlu a podľa možnosti aplikovať tesne za uchom, kolmo na kožu.

Nepodávať viac ako 5 ml do jedného miesta vpichu.

4.10 Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné

Pri vysokých dávkach sa môže vyskytnúť slinenie a ťažké dýchanie. Tieto vedľajšie účinky odznejú spontánne a nespôsobujú ďalšie poškodenie. U kancov predávkovanie (>1 mg/kg) môže spôsobiť uvoľnenie penisu, ktoré môže mať za následok jeho poškodenie. Účinok závisí od veľkosti dávky. Stresnil môže vyvolať všetky stupne sedácie.

4.11 Ochranná (-é) lehota (-y)

Mäso a vnútornosti: 18 dní

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotikum, deriváty butyferonu
kód ATCvet: QN05AD90

Stresnil je sedatívne butyrofenónové neuroleptikum s výraznými α-adrenergnými vlastnosťami na osobitné použitie u ošípaných.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Stresnil po intramuskulárnej aplikácii vyvolá predvídanú psychomotorickú sedáciu bez narkózy. Stupeň sedácie je priamo úmerný veľkosti dávky. Dospelé zvieratá potrebujú v porovnaní s mladšími nižšie dávky. Pri nízkych dávkach (0,5 mg/kg ž.hm.) sú zvieratá mierne sedované a pripravené na ľahké prehnanie. So zvyšujúcimi sa dávkami sú zvieratá viac ospalé a pomalšie. Pri dávke 2 mg/kg ž.hm. polihujú na zemi po dobu približne 2 hodín, môžu sa prehnať a prestávajú byť agresívne. Indukčná doba je krátka. Maximálny účinok sa dosiahne asi po 15 minútach u mladých zvierat a po 30 minútach u dospelých zvierat. Účinok pretrváva 1 – 3 hodiny a závisí od veľkosti dávky a hmotnosti zvieraťa.

5.2 Farmakokinetické údaje

Po injekčnom podaní sa azaperón rýchlo absorbuje a maximálnu koncentráciu dosiahne do 1 hodiny po podaní. Eliminácia z plazmy je rýchla (T 1/2 = 2,5 hod.) kvôli rýchlosti a extenzite metabolizmu a exkrécii.

Hlavné časti metabolizmu sú:
1) redukcia butanonu
2) oxidatívna N-dearylácia
3) hydroxylácia pyridínovej skupiny

Cieľovým tkanivom azaperónu a jeho metabolitov je pečeň. Nízke hladiny rezíduí sú prítomné v svaloch aj ostatných jedlých tkanivách.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Kyselina vínna

Disiričitan sodný (E 223)
Hydroxid sodný
Metylparabén (E218)
Propylaparabén (E 216)
Voda na injekciu

6.2 Závažné inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v neporušenom obale: 3 roky.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní.

6.4 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 °C.

6.5 Charakter a zloženie vnútorného obalu

Sklenená injekčná liekovka s prepichovacou gumenou zátkou a hliníkovým viečkom. Vonkajší obal papierová škatuľka. Priložená písomná informácia pre používateľov.
Veľkosť balenia: 1 x 100 ml.

6.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov, ak sú potrebné

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

70/073/71-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 13.10.1971
Dátum posledného predĺženia: 20.9.2009

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

ZÁKAZ PREDAJA, DODÁVOK A/ALEBO POUŽÍVANIA
Netýka sa.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM A VNÚTORNOM OBALE

{papierová škatuľka, sklenená liekovka}

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Stresnil 40 mg/ml injekčný roztok pre ošípané

2. ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

1 ml obsahuje:
Účinná látka:
Azaperonum 40 mg

Pomocné látky:
Metylparabén (E218) 0,5 mg
Propylaparabén (E 216) 0,05 mg

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.

4. VEĽKOSŤ BALENIA

100 ml

5. CIEĽOVÝ DRUH

Ošípané.

6. INDIKÁCIA (-IE)

Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Intramuskulárne podanie.
Nepodávať viac ako 5 ml do jedného miesta vpichu.
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8. OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso a vnútornosti: 18 dní

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Vonkajší obal: Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní.
Vnútorný obal: Dátum prvého otvorenia: …

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami..

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá.
Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Nemecko

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

70/073/71-S

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže {číslo}

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Stresnil 40 mg/ml injekčný roztok pre ošípané

1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Nemecko

Výrobca zodpovedný za uvolnenie šarže:
Elanco France S. A.S., 26 Rue de la Chapelle, 68330 Huningue, Francúzsko

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Stresnil 40 mg/ml injekčný roztok pre ošípané

3. OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY(-OK) A INEJ LÁTKY(-OK)

1 ml obsahuje:
Účinná látka:
Azaperonum 40 mg

Pomocné látky:
Metylparabén (E218) 0,5 mg
Propylaparabén (E 216) 0,05 mg

Číry, bledožltý až žltý roztok

4. INDIKÁCIA(-E)

1. Zvládnutie stresu
- prevencia a zvládnutie agresivity po zoskupení
- zvládnutie agresivity u prasníc

2. Na liečbu rôznych stavov podobných stresu
- pri srdcovej záťaži
- pri transportnej záťaži

3. Pôrodníctvo
- prerušenie pôrodu spôsobené excitáciou
- pomoc pri pôrode (manuálny pôrod)
- pri náprave inversio vaginae alebo prolapsus uteri
- zosilnené kontrakcie

4. Premedikácia pri lokálnej alebo celkovej anestézii

5. KONTRAINDIKÁCIE

Z dôvodu možného výskytu rezíduí v tkanivách, Stresnil je kontraindikovaný pri transporte alebo zoskupovaní ošípaných, ktoré by mali byť porazené skôr ako 18 dní po aplikácii.

Vyhýbať sa aplikácii lieku za veľmi chladných podmienok, pretože je možné riziko kardiovaskulárneho kolapsu spôsobené periférnou vazodilatáciou.

6. NEŽIADUCE ÚČINKY

Stresnil je bezpečný a veľmi dobre znášaný. Pri vysokých dávkach sa môže vyskytnúť slinenie a ťažké dýchanie. Tieto nežiaduce účinky odznejú spontánne a nespôsobujú ďalšie poškodenie. U kancov neprekročiť dávku 1 mg/kg ž. hm, pretože predávkovanie môže spôsobiť uvoľnenie penisu, ktoré môže mať za následok jeho poškodenie.

7. CIEĽOVÝ DRUH

Ošípané.

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Agresivita

1. Prevencia a kontrola agresivity, bojovnosť pri preskupovaní:

Dávka: 2 mg/kg ž.hm. (1 ml/20 kg)

Prevencia agresivity pri preskupovaní

Ošípané z rôznych vrhov alebo kotercov sa môžu zoskupiť do jedného koterca hneď po injekcii Stresnilu. Po niekoľkých minútach si spoločne líhajú približne na 2 hodiny, bez ohľadu na ich pôvod. Neskôr, po vymiznutí účinku Stresnilu, výskyt bojovnosti nie je pravdepodobný. Liečiť by sa mali všetky zvieratá v skupine. Rešpektovať indikovanú dávku. Ak je dávka príliš nízka, zviera je upokojené, ale agresivita je potlačená len dočasne alebo vôbec. Ak je dávka príliš vysoká, zvieratá sa po precitnutí môžu dostať do stavu nebezpečnej bojovnosti. V deň liečby neošetrené zvieratá nevypúšťať do výbehu. Odstaveným prasiatkam sa môže Stresnil podávať pri naskladnení do výkrmu.

Liečebné použitie

Krátko po injekcii Stresnilu bojovné zvieratá sa upokoja. Zostávajú pokojné aj potom, keď sa účinok lieku vytráca. Nekastrované kance ostávajú po vymiznutí účinku Stresnilu aj naďalej o niečo agresívnejšie.

2. Agresívne prasnice

Dávka: 2 mg/kg ž. hm. (1 ml/20 kg)

Prasnica, ktorá nechce prijať novo narodené prasiatka alebo ich hryzie, začína ich akceptovať ½ -1 hodinu po liečbe. K aplikácii je nutné pristupovať opatrne, aby sa prasnica nevystrašila. Rešpektovať indikovanú dávku. Ak je dávka príliš nízka, sedácia je len dočasná. Ak je dávka príliš vysoká, po vymiznutí účinku Stresnilu môžu zvieratá znovu upadnúť do útlmu.

Stres

1. Záťaž srdca

Dávka: 0,4 mg/kg ž. hm. (1 ml/100 kg)

Zviera je upokojené do niekoľkých minút po injekcii. Chvenie sa zmenšuje a dýchanie prehlbuje. Cyanóza postupne mizne a frekvencia pulzu klesá. V prípade nedostatočného výsledku po 15 minútach sa môže podať druhá dávka. Je dôležité liečiť zvieratá ihneď po spozorovaní prvých klinických príznakov (napr. zrýchlené dýchanie).

2. Preprava

- Preprava prasiatok

Dávka: 0,4 – 2 mg/kg ž. hm. (1 ml/100 kg – 1 ml/20 kg)

Dávka 0,4 mg/kg podaná 15 – 30 minút pred transportom znižuje mortalitu a straty hmotnosti počas transportu. Dávka zvýšená na 2 mg/kg je prevenciou bojovnosti počas transportu. Zvieratá musia mať dosť miesta na ležanie a prevozné auto musí mať dostatočnú ventiláciu. Po injekcii zostávajú zvieratá ospalé 2 – 3 hodiny.

- Preprava kancov
Dávka: 1 mg/kg ž. hm. (0,5 ml/20 kg)
Injekciu aplikovať 15 – 30 minút pred nakladaním. Počas indukčnej doby zvieratá držať oddelene v pokojnom prostredí. Po injekcii zostávajú zvieratá ospalé 2 – 3 hodiny. Neprekročiť dávku 1 mg/kg ž.hm. Predávkovanie môže spôsobiť uvoľnenie penisu, ktoré môže mať za následok jeho poškodenie.

Pôrodníctvo
Dávka: 2 mg/kg ž. hm. (1 ml/20 kg)
- prerušenie pôrodu spôsobené s excitáciou
- pomoc pri pôrode (manuálny pôrod)
- počas korekcie inversio vaginae alebo prolapsus uteri
- zosilnené kontrakcie

Premedikácia anestézie
Dávka: 1 – 2 mg/kg ž. hm. i. m. (0,5 – 1 ml/20 kg)
Stresnil v kombinácii s hypnotikami navodzuje stav celkovej anestézie, čo umožňuje vykonanie takmer väčšiny chirurgických zákrokov (diagnostické skúšky, kastrácia, kryptorchizmus, ingviálna alebo umbilikálna hernia, prolaps rekta a cisársky rez).

Spôsob podania: intramuskulárne
Nepodávať viac ako 5 ml do jedného miesta vpichu.

9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Pri všetkých indikáciách aplikovať prísne intramuskulárne v oblasti za uchom. Použiť dlhú hypodermickú ihlu a podľa možnosti aplikovať tesne za uchom, kolmo na kožu. Ak sa u veľkých zvierat použije krátka ihla, existuje riziko, že sa liek dostane iba do tuku. V takýchto prípadoch účinok môže byť nedostatočný. Po injekcii, počas indukčnej doby, zvieratá ustajniť na pokojnom mieste. Ak sú zvieratá počas indukčnej doby vyrušované alebo naháňané, účinok môže byť nedostatočný.

10. OCHRANNÁ LEHOTA

Mäso a vnútornosti: 18 dní.

11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávať pri teplote do 25°C.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní.
Dátum prvého otvorenia: (uvedený na vnútornom obale).
Nepoužívať liek po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale.

12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Osobitné bezpečnostné opatrenia ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:
Ľudia so známou precitlivenosťou na azaperón sa musia vyhýbať kontaktu s týmto veterinárnym liekom. Stresnil, rovnako ako ostatné butyrofenóny, spôsobuje sedáciu človeka. Preto, pri jeho aplikácii postupovať veľmi opatrne, aby nedošlo k injikovaniu osôb. Pri náhodnej injekcii vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi ukázať písomnú informáciu alebo obal.

V prípade zasiahnutia kože alebo očí, exponované miesto ihneď umyť vodou.

Ak sa po kontakte s liekom vyvinú symptómy ako začervenanie kože, opuch pier, tváre a očí alebo sťažené dýchanie ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu alebo obal lekárovi.
Po manipulácii s liekom si umyť ruky.

Použitie počas gravidity, laktácie:
Stresnil sa môže bez rizika podávať gravidným zvieratám a zvieratám v laktácii.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:
Ak sa Stresnil podáva v kombinácii s inými injekčnými liekmi, nemiešať v jednej striekačke.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné:
Pri predávkovaní sa môže vyskytnúť slinenie a ťažké dýchanie. Tieto vedľajšie účinky odznejú spontánne a nespôsobujú ďalšie poškodenie. U kancov predávkovanie (>1 mg/kg) môže spôsobiť uvoľnenie penisu, ktoré môže mať za následok jeho poškodenie. Účinok závisí od veľkosti dávky. Stresnil môže vyvolať všetky stupne sedácie.

13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Len pre zvieratá.
Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

Veľkosť balenia: 1 x 100 ml

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.