

1. strana

Koláž produktu, kravského vemena a štítu s nápisom Keraseal

KERASEAL

intramamálna suspenzia

(Bismuthi subnitras)

Ochrana zdravého vemena v období státia nasucho

2. strana

prosím text do „blokov“ vždy k nadpisu v bolde patrí blok

KERASEAL

intramamálna suspenzia

24x 2,6 g aplikátor

Variabilné možnosti použitia

Aplikácia lieku do každej štvrtky vytvára fyzickú bariéru proti vstupu baktérií a tým znižuje výskyt nových intramamálnych infekcií počas obdobia státia na sucho. Pôsobí preventívne proti novej infekcii počas obdobia státia nasucho. Týmto spôsobom liek redukuje výskyt klinických mastitíd v ďalšej laktácii.

U kráv, u ktorých sa nepredpokladá výskyt subklinických mastitíd sa môže Keraseal aplikovať samostatne pri zasušení a kontrole.

Výber kráv na liečbu liekom Keraseal by mal byť založený na veterinárnom klinickom posúdení.

Kritériá na výber dojníc môžu byť založené na základe výskytu mastitíd a počtu somatických buniek u jednotlivých kráv alebo na základe testu na detekciu subklinických mastitíd alebo bakteriologického vyšetrenia.

U kráv, ktoré môžu mať subklinickú mastitídu, Keraseal sa môže použiť po podaní vhodnej antibiotickej liečby do infikovanej štvrtky.

Dlhotrvajúca bariéra

Bizmut subnitrát nie je absorbovaný z mliečnej žľazy, ale zostáva ako zátko v cecku až do manuálneho odstránenia (preukázané u kráv v období státia na sucho až do 100 dní).

Tipy pre správnu aplikáciu

Len na intramamálnu aplikáciu.

Obsah jednej striekačky veterinárneho lieku aplikovať do každej štvrtky mliečnej žľazy ihneď po poslednom dojení v laktácii (v období zasušovania). Po aplikácii lieku cecok ani vemenom nemasírovať.

Aplikátor má aplikačnú špičku s dvomi rôznymi priermi, pre rôzne tvarované ceckové kanále.

Je potrebné dbať na to, aby sa do cecka nedostali patogény, aby sa znížilo riziko postinfúznej mastitídy.

Je nevyhnutné, aby bol cecok pred aplikáciou dôkladne očistený a dezinfikovaný chirurgickým liehom alebo dezinfekčným obrúskom. Cecky by sa mali čistiť dovtedy, kým obrúsky nie sú viditeľne bez špiny. Cecky pred aplikáciou nechať uschnúť. Aplikovať asepticky a vyvarovať sa nožnej kontaminácie hrotu striekačky. Po aplikácii sa odporúča ponoriť cecok do príslušného roztoku alebo jeho sprejovanie.

V chladných podmienkach môže byť liek zahriaty na izbovú teplotu, čo uľahčí jeho aplikáciu.

Bez antibiotík, bez ochranných lehôt na mlieko a mäso!

Upozornenie

Je dôležité dodržiavať prísnu aseptickú techniku podávania Kerasealu, pretože liek nemá antimikrobiálnu aktivitu. Aby sa predišlo kontaminácii, neponárať striekačku do vody. Striekačku použiť len raz.

Kontakty Cymedica SK

Logo Cymedica