

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

TOP SPOT ON STRONGER 650 mg/ml roztok na nakvapkanie na kožu

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1,00 ml roztoku obsahuje:

účinná látka – Permethrinum 650 mg

pomocné látky – butylparabén 1mg, butylhydroxyanizol 0,2 mg, butylhydroxytoluén 0,1 mg

Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Roztok na nakvapkanie na kožu.

Svetložltý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cieľový druh

Pes, kôň

4.2 Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Liečebné a preventívne použitie u psov a koní, pri napadnutí blchami, kliešťami a lietajúcim hmyzom.

4.3 Kontraindikácie

Nepoužívať u mačiek, liek je pre ne toxický. Nepoužívať u šteniat a žriebät mladších ako 3 týždne.

4.4 Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Po aplikácii sa odporúča počas 12 - 24 hod. obmedziť manipuláciu so zvieratami a ich pohyb na slnku. Do 48 hodín po ošetrení sa neodporúča šampónovanie zvierat. Šampónovanie môže negatívne ovplyvniť dĺžku ochranného účinku.

4.5 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

V ojedinelých prípadoch u zvlášť citlivých jedincov sa na mieste aplikácie môže objaviť prechodné podráždenie kože.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Liek je toxický pre ryby, preto sa ním nesmú kontaminovať vodné toky a ošetreným psom nedovoľte do 12 hodín od ošetrenia plávať vo vodných tokoch s výskytom rýb.

Počas aplikácie nefajčite, nejedzte a nepite. Je nutné zabrániť kontaktu obsahu aplikátora so sliznicou ošetrovaného zvierťa a ošetrovateľa. Chráňte oči pred kontaktom s liekom. Po aplikácii si umyte ruky mydlom a vodou. Počas opakovanej aplikácie (napríklad v chovných zariadeniach alebo v útulkoch pre psov) sa odporúča použitie neoprénových rukavíc s hrúbkou min. 3 mm. Uchovávajte mimo dosahu detí!

4.6 Nežiaduce účinky

Na mieste aplikácie sa môže dočasne objaviť podráždenie kože.

4.7 Použitie počas gravidity, laktácie

Liek nemá vplyv na graviditu a laktáciu.

4.8 Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Nie sú známe.

4.9 Dávkovanie a spôsob podania lieku

Psy –

do 15 kg – obsah 1 aplikátora (1 ml) sa naniesie na kožu medzi lopatkami ak ide o psov malých plemien – (Dog S alebo 1 aplikátor z hromadného balenia).

od 15 do 30 kg – obsah 2 aplikátorov (2 x 1ml) sa naniesie na kožu medzi lopatkami a pri koreni chvosta, ak ide o psov stredných plemien – (Dog M alebo 2 aplikátory z hromadného balenia).

nad 30 kg – obsah 3 aplikátorov (3 x 1ml) sa naniesie na kožu medzi lopatkami, v strednej časti chrbta a pri koreni chvosta, ak ide o psov veľkých plemien – (Dog L) alebo 3 aplikátory z hromadného balenia).

Kone – obsah 1 balenia pre kone s hmotnosťou cca 500 kg. Liek sa naniesie na niekoľko miest na koži v oblasti kohútika a bedier v množstve 2-3 ml na jedno miesto (Horse).

Spôsob podania : Pred aplikáciou sa rozhrnie srst' a aplikátorom sa nakvapká roztok priamo na kožu.

4.10 Predávkovanie

Pri predávkovaní sa môže objaviť lokálne podráždenie.

4.11 Ochranná lehota

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Terapeutická skupina: Ektoparazitikum

kód ATCvet: QP53AC04

Farmakologické vlastnosti

Mechanizmus účinku permethrínu (patrí do skupiny syntetických pyrethroidov) je založený na ovplyvnení iontových kanálov nervových vlákien parazitov. Narušenie transportu Na⁺ a K⁺ iontov v membránach neurónov spôsobí depolarizáciu a zvýšené uvoľňovanie neurotransmiterov a vzniku neuromuskulárneho bloku ektoparazitov. Proti ektoparazitom pôsobí adulticídne. Ide o ektoparazitikum s veľmi dobrou účinnosťou. Vehikulum zaisťuje depotný účinok lieku. Permethrín nie je toxický pre cicavce a vtáky, ale je toxický pre ryby, včely a plazy.

Liek sa aplikuje na kožu s cieľom dosiahnuť predovšetkým lokálny účinok. Liek obsahuje kombináciu pomocných látok, ktoré vytvárajú systém, umožňujúci absorbovať účinnú látku do horných vrstiev kože (stratum corneum, horná vrstva epidermis) a vytvoriť tu depotné ložisko. Liek sa následne dlhodobo uvoľňuje z ložiska do okolia miesta aplikácie.

Jedna odporúčaná dávka lieku TOP SPOT ON STRONGER zabezpečuje ochranu proti lietajúcemu hmyzu po dobu až 14 dní, proti kliešťom po dobu 4 týždňov a proti blehám po dobu 3 mesiacov.

Vplyv na životné prostredie

Liek je toxický pre ryby, včely a plazy, preto ním nekontaminujte vodné toky a do 12 hodín po ošetrení zvieratám nedovoľte plávať vo vodných tokoch s výskytom rýb.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Butylparabenum/ butylparabén, Butylhydroxyanisolum/ butylhydroxyanizol, Butylhydroxytoluenum/ butylhydroxytoluén, Diethylenglycoli monoethylicum aetherum/ dietylenglykolmonoetyléter, Propyleglycolum lauricum/ propylenglykol laurát

6.2 Inkompatibility

Nie je známa.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky v neporušenom obale

6.4 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom.

6.5 Charakter a zloženie vnútorného obalu

Psy 1 x 1 ml (Dog S), 2 x 1 ml (Dog M), 3 x 1 ml (Dog L), 25 x 1 ml, 50 x 1 ml, 100 x 1 ml (Dog)
Aplikátory z umelej hmoty sú balené v kartónových škatuľkách.

Kone 1 x 25 ml (Horse)

Fľaštičky z umelej hmoty sú balené v kartónových škatuľkách.

Ku každému baleniu sa pridáva schválená písomná informácia pre používateľov.

6.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov ak sú potrebné.

každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bioveta a.s., Komenského 212, Ivanovice na Hané, Česká republika

tel. + 420 517 318 500

fax + 420 517 318 653

e-mail comm@bioveta.cz

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

96/023/04-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

15.4.2004

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Vydáva sa bez veterinárneho predpisu.

**ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE
= TEXT PÍSOMNEJ INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV**

Kartónová škatuľka 1 x 1 ml (Dog S), 2 x 1 ml (Dog M), 3 x 1 ml (Dog L)

Samostatná písomná informácia sa k tomuto baleniu už neprikladá!

1. NÁZOV LIEKU

TOP SPOT ON STRONGER 650 mg/ml, roztok na nakvapkanie na kožu

2. ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

1,00 ml roztoku obsahuje:

účinná látka – Permethrinum 650 mg

pomocné látky –butylparabén, butylhydroxyanizol, butylhydroxytoluén, dietylénglykolmonoetyléter, propylénglykol laurát

3. LIEKOVÁ FORMA

Roztok na nakvapkanie na kožu.

4. VEĽKOSŤ BALENIA

1 x 1 ml (Dog S), 2 x 1 ml (Dog M), 3 x 1 ml (Dog L)

5. CIEĽOVÝ DRUH

Pes.

6. INDIKÁCIA

Liečebné a preventívne použitie u psov pri napadnutí blchami, kliešťami a lietajúcim hmyzom.

7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Pred aplikáciou sa rozhrnie srst' a aplikátorom sa nanáša roztok priamo na kožu.

Balenie 1 x 1 ml (Dog S)

Psy do 15 kg – obsah 1 aplikátora (1 ml) sa naniesie na kožu medzi lopatkami ak ide o psov malých plemien.

Balenie 2 x 1 ml (Dog M)

Psy od 15 do 30 kg – obsah 2 aplikátorov (2 x 1 ml) sa naniesie na kožu medzi lopatkami a pri koreni chvosta, ak ide o psov stredných plemien.

Balenie 3 x 1 ml (Dog L)

Psy nad 30 kg – obsah 3 aplikátorov (3 x 1 ml) sa naniesie na kožu medzi lopatkami, v strednej časti chrbta a pri koreni chvosta, ak ide o psov veľkých plemien.

Jedna odporúčaná dávka lieku TOP SPOT ON STRONGER zabezpečuje ochranu proti lietajúcemu hmyzu po dobu až 14 dní, proti kliešťom po dobu 4 týždňov a proti blchám po dobu 3 mesiacov.

8. OCHRANNÁ LEHOTA

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE

Počas aplikácie nefajčite, nejedzte a nepite. Je nutné zabrániť kontaktu obsahu aplikátora zo sliznicou ošetrovaného zvierat'a a ošetrovateľ'a. Chráňte oči pred kontaktom s liekom. Po aplikácii si umyte ruky mydlom a vodou. Počas opakovanej aplikácie (napríklad v chovných zariadeniach alebo v útulkoch pre psy) sa odporúča použitie neoprénových rukavíc o sile min. 3 mm.

Po aplikácii sa odporúča po dobu 12 - 24 hod. obmedziť manipuláciu so zvieratami a ich pohyb na slnku. Po ošetrení sa po dobu 48 hodín neodporúča šampónovanie zvierat. Šampónovanie môže negatívne ovplyvniť dĺžku ochranného účinku.

V ojedinelých prípadoch u zvlášť citlivých jedincov sa na mieste aplikácie môže objaviť prechodné podráždenie kože.

Liek je toxický pre ryby, včely a plazy.

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na obale.

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Liek je toxický pre ryby, včely a plazy, preto ním nekontaminujte vodné toky a do 12 hodín po ošetrení zvieratám nedovoľte plávať vo vodných tokoch s výskytom rýb.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA

Len pre zvieratá - vydáva sa bez veterinárneho predpisu.

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dosahu detí.

15. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCI

Bioveta a.s., Komenského 212, Ivanovice na Hané, Česká republika

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

96/023/04-S

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže

18. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Kontraindikácie: Nepoužívať u mačiek, liek je pre ne toxický. Nepoužívať u šteniat a žriebät mladších ako 3 týždne.

Nežiaduce účinky: Na mieste aplikácie sa môže dočasne objaviť podráždenie kože.

Interakcie: Nie sú známe.

Dátum posledného schválenia textu:

EAN kód

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Kartónová škatuľka 25 x 1 ml, 50 x 1 ml, 100 x 1 ml (Dog)
Hromadné balenie

1. NÁZOV LIEKU

TOP SPOT ON STRONGER 650 mg/ml, roztok na nakvapkanie na kožu

2. ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

1,00 ml roztoku obsahuje:

účinná látka – Permethrinum 650 mg

pomocné látky –butylparabén, butylhydroxyanizol, butylhydroxytoluén, dietylénglykolmonoetyléter, propylénglykol laurát

3. LIEKOVÁ FORMA

Roztok na nakvapkanie na kožu.

4. VEĽKOSŤ BALENIA

25 x 1 ml, 50 x 1 ml, 100 x 1 ml (Dog)

5. CIEĽOVÝ DRUH

Pes.

6. INDIKÁCIA

Liečebné a preventívne použitie u psov pri napadnutí blchami, kliešťami a lietajúcim hmyzom.

7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Pred aplikáciou sa rozhrnie srst' a aplikátorom sa nanáša roztok priamo na kožu.

Psy

do 15 kg – obsah 1 aplikátora (1 ml) sa nanesie na kožu medzi lopatkami ak ide o psov malých plemien.

od 15 do 30 kg – obsah 2 aplikátorov (2 x 1 ml) sa nanesie na kožu medzi lopatkami a pri koreni chvosta, ak ide o psov stredných plemien.

nad 30 kg – obsah 3 aplikátorov (3 x 1 ml) sa nanesie na kožu medzi lopatkami, v strednej časti chrbta a pri koreni chvosta, ak ide o psov veľkých plemien.

Jedna odporúčaná dávka lieku TOP SPOT ON STRONGER zabezpečuje ochranu proti lietajúcemu hmyzu po dobu až 14 dní, proti kliešťom po dobu 4 týždňov a proti blchám po dobu 3 mesiacov.

8. OCHRANNÁ LEHOTA

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

10. DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom.

**12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE
NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU**

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Liek je toxický pre ryby, včely a plazy, preto ním nekontaminujte vodné toky a do 12 hodín po ošetrení zvieratám nedovoľte plávať vo vodných tokoch s výskytom rýb.

**13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA
TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA**

Len pre zvieratá - vydáva sa bez veterinárneho predpisu.

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dosahu detí.

15. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCI

Bioveta a.s., Komenského 212, Ivanovice na Hané, Česká republika

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

96/023/04-S

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže

EAN kód

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Etiketa 1 ml (Dog)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

TOP SPOT ON STRONGER

2. MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY

Permethrin 650 mg/ 1 ml

3. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 ml

4. SPÔSOB PODANIA LIEKU

Aplikovať priamo na kožu.

5. OCHRANNÁ LEHOTA

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

6. ČÍSLO ŠARŽE

č. šarže

7. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

8. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Kartónová škatuľka, 1 x 25 ml (Horse)

1. NÁZOV LIEKU

TOP SPOT ON STRONGER 650mg/ml roztok na na nakvapkanie na kožu

2. ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

1,00 ml roztoku obsahuje:

účinná látka – Permethrinum 650 mg

pomocné látky –butylparabén, butylhydroxyanizol, butylhydroxytoluén, dietylénglykolmonoetyléter, propylénglykol laurát

3. LIEKOVÁ FORMA

Roztok na na nakvapkanie na kožu.

4. VEĽKOSŤ BALENIA

1 x 25 ml

5. CIEĽOVÝ DRUH

Kôň

6. INDIKÁCIA

Liečebné a preventívne použitie u koní pri napadnutí blchami, kliešťami a lietajúcim hmyzom.

7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Pred aplikáciou sa rozhrnie srst' a aplikátorom sa nakvapká roztok priamo na kožu.

8. OCHRANNÁ LEHOTA

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Liek je toxický pre ryby, včely a plazy, preto ním nekontaminujte vodné toky a do 12 hodín po ošetrení zvieratám nedovoľte plávať vo vodných tokoch s výskytom rýb.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA

Len pre zvieratá - vydáva sa bez veterinárneho predpisu.

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dosahu detí.

15. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCI

Bioveta a.s., Komenského 212, Ivanovice na Hané, Česká republika

16. REGISTRÁČNÉ ČÍSLO

96/023/04-S

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže

EAN kód

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Etiketa 25 ml (Horse)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

TOP SPOT ON STRONGER 650 mg/ml roztok na nakvapkanie na kožu

2. MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY

1,00 ml roztoku obsahuje : Permethrinum 650 mg

3. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

25 ml

4. SPÔSOB PODANIA LIEKU

Pred aplikáciou sa rozhrnie srst' a aplikátorom sa nakvapká roztok priamo na kožu.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

5. OCHRANNÁ LEHOTA

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

6. ČÍSLO ŠARŽE

č. šarže

7. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

8. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

TOP SPOT ON STRONGER 650 mg/ml, roztok na nakvapkanie na kožu

1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Bioveta a.s., Komenského 212, Ivanovice na Hané, Česká republika

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

TOP SPOT ON STRONGER 650 mg/ml, roztok na nakvapkanie na kožu

3. ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

1,00 ml roztoku obsahuje:

účinná látka – Permethrinum 650 mg

pomocné látky –butylparabén, butylhydroxyanizol, butylhydroxytoluén, dietylénglykolmonoetyléter, propylénglykol laurát

Vzhľad lieku: Svetložltý roztok.

4. INDIKÁCIA

Liečebné a preventívne použitie pre u psov a koní, pri napadnutí blchami, kliešťami a lietajúcim hmyzom.

5. KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívať u mačiek, liek je pre ne toxický. Nepoužívať u šteniat a žriebät mladších ako 3 týždne.

6. NEŽIADUCE ÚČINKY

Na mieste aplikácie sa môže dočasne objaviť podráždenie kože.

7. CIEĽOVÝ DRUH

Pes, kôň.

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Psy –

do 15 kg – obsah 1 aplikátora (1 ml) sa naniesie na kožu medzi lopatkami ak ide o psov malých plemien – (Dog S alebo 1 aplikátor z hromadného balenia).

od 15 do 30 kg – obsah 2 aplikátorov (2 x 1ml) sa naniesie na kožu medzi lopatkami a pri koreni chvosta, ak ide o psov stredných plemien – (Dog M alebo 2 aplikátory z hromadného balenia).

nad 30 kg – obsah 3 aplikátorov (3 x 1ml) sa naniesie na kožu medzi lopatkami, v strednej časti chrbta a pri koreni chvosta, ak ide o psov veľkých plemien – (Dog L) alebo 3 aplikátory z hromadného balenia).

Kone – obsah 1 balenia pre kone s hmotnosťou cca 500 kg. Liek sa naniesie na niekoľko miest na koži v oblasti kohútika a bedier v množstve 2-3 ml na jedno miesto (Horse).

Jedna odporúčaná dávka lieku TOP SPOT ON STRONGER zabezpečuje ochranu proti lietajúcemu hmyzu po dobu až 14 dní, proti kliešťom po dobu 4 týždňov a proti blchám po dobu 3 mesiacov.

9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Pred aplikáciou sa rozhrnie srst' a aplikátorom nakvapká roztok priamo na kožu.

Počas aplikácie nefajčite, nejedzte a nepite. Je nutné zabrániť kontaktu obsahu aplikátora zo sliznicou ošetrovaného zvierat'a a ošetrovateľ'a. Chráňte oči pred kontaktom s liekom. Po aplikácii si umyte ruky mydlom a vodou. Počas opakovanej aplikácie (napríklad v chovných zariadeniach alebo v útulkoch pre psy) sa odporúča použitie neoprénových rukavíc o sile min. 3 mm.

10. OCHRANNÁ LEHOTA

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať v suchu pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Nepoužívať liek po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na obale.

12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Po aplikácii sa odporúča počas 12 - 24 hod. obmedziť manipuláciu so zvieratami a ich pohyb na slnku. Do 48 hodín po ošetrení sa neodporúča šampónovanie zvierat. Šampónovanie môže negatívne ovplyvniť dĺžku ochranného účinku.

V ojedinelých prípadoch u zvlášť citlivých jedincov sa na mieste aplikácie môže objaviť prechodné podráždenie kože.

13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Liek je toxický pre ryby, včely a plazy, preto ním nekontaminujte vodné toky a do 12 hodín po ošetrení zvieratám nedovoľte plávať vo vodných tokoch s výskytom rýb.

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍ SOMNEJ INFORMÁ CII PRE POUŽÍVATEĽOV

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Interakcie

Nie sú známe.

Veľkosť balenia

Psy 1 x 1 ml (Dog S), 2 x 1 ml (Dog M), 3 x 1 ml (Dog L), 25 x 1 ml, 50 x 1 ml, 100 x 1 ml (Dog)

Kone 1 x 25 ml (Horse)

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá.

Vydáva sa bez veterinárneho predpisu.

