

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ VETERINÁRNEHO LIEKU

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

TOP SPOT ON DOG S, roztok na nakvapkanie na kožu – spot-on pre psy

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 aplikátor (1 ml) roztoku obsahuje:

Účinná látka

Permethrinum 650 mg

Pomocné látky

Butylhydroxyanisol (E320) 0,2 mg

Úplný zoznam pomocných látok vid' bod 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Roztok na nakvapkanie na kožu – spot-on.

Žltkastý, číry roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cieľové druhy zvierat

Psy (do 15 kg).

4.2 Indikácia s upresnením pre cieľový druh zvierat

Liečebné a preventívne použitie u psov proti ektoparazitom – blchám a kliešťom.

4.3 Kontraindikácia

Nepoužívať u mačiek, liek je pre ne toxický (vid' bod 4.4)!

Nepoužívať u šteniat mladších ako 3 týždne. Nepoužívať u šteniat a psov s hmotnosťou nižšou než 2 kg.

Nepoužívať v prípade precitlivelosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.

4.4. Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Tento liek je extrémne jedovatý pre mačky a jeho podanie mačkám môže viesť až k ich úhynu z dôvodu špecifickej fyziológie mačiek, ktoré nie sú schopné metabolizovať určité látky vrátane permethrinu. Aby sa zabránilo náhodnému kontaktu mačiek s liekom, udržiajte psy po ošetrení oddelene od mačiek, pokiaľ nie je miesto aplikácie suché. Je potrebné zabezpečiť česanie psov, ktorým bol v posledných 48 hodinách aplikovaný tento liek a mačiek odlišnou kefou, z dôvodu možnej toxicity takto prenesenej látky pre mačky. Pri náhodnom použití tej istej kefy vyhľadajte v prípade zmien správania mačky veterinárneho lekára.

Presne dodržiavajte vhodnú veľkosť balenia. Pre malé psy, psy malých plemien, je kontraindikované podanie lieku Top spot on Dog M alebo Top spot on Dog L. Pre stredne veľké psy, psy stredných plemien, je kontraindikované podanie lieku Top spot on Dog L.

Po aplikácii sa odporúča počas 12 – 24 hod. obmedziť manipuláciu so zvieratami. Neodporúča sa ich pohyb na slnku. Po ošetrení sa neodporúča počas 12 hodín kúpanie zvierat. Šampónovaním môže byť negatívne ovplyvnená dĺžka ochranného účinku.

Rezistencia parazitov voči ktorejkoľvek skupine ektoparazitík sa môže vyvinúť po častom, opakovanom použití ektoparazitika z rovnakej skupiny, s rovnakým spôsobom účinku.

4.5. Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat

Liek aplikovať len na povrch kože. Neaplikovať perorálne alebo parenterálne. Vyhnúť sa podaniu lieku na sliznice (do očí, nozdier, na sliznice genitálií a do miest poranenia kože). Je dôležité zaistiť aplikáciu lieku na určené miesto a po aplikácii zabrániť olizovaniu miesta podania i vzájomnému olizovaniu zvierat. V ojedinelých prípadoch u zvlášť citlivých jedincov môže dôjsť k prechodnému podráždeniu kože v mieste aplikácie. V týchto prípadoch opláchnite zviera vodou.

Vzhľadom na možnosť zamorenia miesta pobytu zvierat blchami, je nutná pravidelná asanácia prostredia vhodným insekticídum.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Počas aplikácie lieku nejedzte, nepite ani nefajčite.

Na dýchací trakt pôsobí liek dráždivo. Zabráňte kontaktu lieku s kožou a očami.

V prípade náhodného znečistenia kože okamžite umyte zasiahnuté miesto vodou a mydlom.

V prípade náhodného kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite vodou.

Ak podráždenie kože alebo očí pretrváva, alebo ak je veterinárny liek náhodne prehltnutý, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu alebo etiketu praktickému lekárovi.

Ľudia so známou precitlivosťou na permethrín by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto veterinárnym liekom.

Po použití si umyte ruky.

Nemanipulujte s ošetrovanými zvieratami a zabráňte deťom hrať sa s nimi, dokiaľ nezaschne miesto aplikácie, a to najmenej 24 hodín po aplikácii. Odporúča sa preto neošetrovať zvieratá počas dňa, ale v podvečer, a nedovoľiť čerstvo ošetrovaným zvieratám spať s ich majiteľmi, obzvlášť s deťmi.

Ďalšie opatrenie

Liek môže mať nežiaduce účinky na vodné živočíchy.

Ošetrovaným psom zamedziť prístup k vodným tokom a vodným zdrojom počas 2 dní po ošetrení.

4.6 Nežiaduce účinky

V mieste aplikácie môže dôjsť k prechodnému podráždeniu kože. V týchto prípadoch opláchnite zviera vodou a chráňte ho pred prechladnutím. V prípade pretrvávajúcich nežiaducich účinkov vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára.

4.7 Použitie počas gravidity, laktácie

Liek nemá vplyv na graviditu a laktáciu.

4.8 Interakcia s ďalšími liečivými prípravkami a ďalšie formy interakcie

Nepoužívajte liek v kombinácii s inými insekticídnymi ektoparazitikami.

4.9 Podávané množstvo a spôsob podania

Len na podanie nakvapkaním na kožu – spot-on.

Psy do 15 kg – obsah aplikátora (1 ml) sa naniesie na kožu v oblasti medzi lopatkami u psov malých plemien.

Spôsob podania

Aplikátor držte hrdlom hore a niekoľkokrát poklepte na hrdlo prstom. Opatrne odlomte špic krúživým pohybom. Rozhrňte srst zvierat a v chrbtovom hrbole pred lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Hrot nástavca priložte na kožu a niekoľkokrát stlačte aplikátor tak, aby sa celý obsah aplikátora vyprázdnil priamo na kožu. Nevtierajte.

Ak psy po ošetrení premoknú alebo sú šampónované, je nutné ošetrenie opakovať. Interval medzi jednotlivými ošetreniami by mal byť najmenej 7 dní.

4.10 Predávkovanie

Pri predávkovaní môže dôjsť k lokálnemu podráždeniu kože, zmene citlivosti až znečistivaniu, svrbeniu, brneniu a páleniu. Ak dôjde k vstreknutiu účinnej látky do oka, môže vyvolať slzenie a prechodnú konjunktivitídu. Liek pôsobí dráždivo na dýchací trakt. Môže sa objaviť kašeľ, kýchanie a výtok z nosa. Po prehltnutí účinnej látky dochádza k bolestiam v krku, ktoré sú sprevádzané nauzeou, zvracaním a abdominálnou bolesťou. V dutine ústnej môžu byť prítomné ulcerácie a je zvýšená

sekrécia slín. Systémové príznaky sa objavia o 4–48 hodín po expozícii (závrata, bolesti hlavy a únava, palpitácia srdca, bolesť na hrudi, zastrený zrak). Kóma a kŕče sú život ohrozujúce stavy.

V prípade náhodného kontaktu lieku s okom, oko opatrne vypláchnite čistou vodou. Ak liek pôsobí dráždivo v mieste aplikácie, opláchnite zviera čistou vodou. Ak sa objavia systémové príznaky, vyhľadajte veterinárneho lekára.

4.11 Ochranné lehoty

Nie je určené pre potravinové zvieratá.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: ektoparazitiká, insekticídy a repelenty, pyrethríny a pyrethroidy.

ATCvet kód: QP53AC04

Farmakologické vlastnosti

Mechanizmus účinku permethrínu (patrí do skupiny syntetických pyrethroidov) je založený na ovplyvnení iónových kanálov nervových vlákien parazitov. Narušenie transportu Na⁺ a K⁺ iónov v membránach neurónov spôsobí depolarizáciu a zvýšené uvoľňovanie neurotransmitterov a vznik neuromuskulárneho bloku pri ektoparazitoch. Proti ektoparazitom pôsobí adulticídne.

Liek sa aplikuje na kožu s cieľom dosiahnuť predovšetkým lokálny účinok. Liek obsahuje kombináciu pomocných látok, ktoré vytvárajú systém umožňujúci absorbovať účinnú látku do horných vrstiev kože (stratum corneum, horná vrstva epidermis) a tu vytvoriť depotné ložisko. Liek je neskôr dlhodobo z ložiska uvoľňovaný.

Jedna odporúčaná dávka lieku TOP SPOT ON DOG S zaisťuje ochranu proti napadnutiu kliešťami až počas 4 týždňov a proti napadnutiu blchami až počas 3 mesiacov.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Butylhydroxyanisol (E 320)

Diethylenglykol-monoethylether

Propylenglykol-monolaurát

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale: 2 roky.

Po otvorení vrečka ihneď spotrebujte.

6.4. Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom. Chrániť pred chladom a mrazom.

6.5. Charakter a zloženie vnútorného obalu

Priehľadný jednodávkový aplikátor z PE s odlamovacím špicom (PE). Aplikátory sú po jednom vložené do zataveného vrečka (PET-Al-PE). Vrecká sú následne vložené do papierovej škatuľky.

Veľkosť balenia: 1, 3 alebo 10 aplikátorov.

Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.

6.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov.

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Tento liek nesmie kontaminovať vodné toky, pretože môže byť nebezpečný pre ryby a ďalšie vodné organizmy. Nekontaminujte rybníky, vodné toky alebo stoky liekom alebo prázdnyimi obalmi.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCI

Bioveta, a.s.
Komenského 212/12
683 23 Ivanovice na Hané
Česká republika
tel. + 420 517 318 500
fax + 420 517 318 653
e-mail comm@bioveta.cz

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

96/003/16-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Veľkosti balenia 3x1 ml, 10x1 ml:

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

Veľkosť balenia 1x1 ml:

Výdaj lieku nie je viazaný na veterinárny predpis..

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDZANÉ NA VNÚTORNOM OBALE

{ALU vrecko na aplikátor 1 ml; papierová skladačka 1 x 1 ml, 3 x 1 ml, 10 x 1 ml}

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

TOP SPOT ON DOG S, roztok na nakvapkanie na kožu – spot-on pre psy
Permethrinum

2. OBSAH LIEČIVÝCH A OSTATNÝCH LÁTKOK

1 aplikátor (1 ml) obsahuje:

Účinná látka

Permethrinum 650 mg

Pomocné látky

Butylhydroxyanisol (E320) 0,2 mg

3. LIEKOVÁ FORMA

Roztok na nakvapkanie na kožu – spot-on.

4. VEĽKOSŤ BALENIA

1 aplikátor

3 aplikátory

10 aplikátorov

5. CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Psy (do 15 kg).

6. INDIKÁCIA

Liečebné a preventívne použitie u psov proti ektoparazitom – blchám a kliešťom.

7. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Podanie nakvapkaním na kožu – spot-on.

Pred použitím čítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8. OCHRANNÁ LEHOTA

Nie je určené pre potravinové zvieratá.

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím čítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: {mesiac/rok}

Po otvorení vrečka ihneď spotrebujte.

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom .Chrániť pred chladom a mrazom.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Liek nesmie kontaminovať vodné toky, pretože môže byť nebezpečný pre ryby a ďalšie vodné organizmy. Nekontaminujte rybníky, vodné toky alebo stoky liekom alebo prázdnyimi obalmi.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA, POKIAĽ SÚ POTREBNÉ

Len pre zvieratá.

Veľkosti balenia 3 a 10 aplikátorov: Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis..

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dosahu detí.

15. MENO A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCI

Bioveta, a. s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

96/003/16-S

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCU

Šarža: {číslo}

**MINIMÁLNE ÚDAJE UVÁDZANÉ NA MALOM
VNÚTORNOM OBALE**

{aplikátor 1 ml}

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

TOP SPOT ON DOG S, roztok na nakvapkanie na kožu – spot-on pre psy
Permethrinum

2. MENO DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCI

Bioveta, a. s.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: {mesiac/rok}

4. ČÍSLO ŠARŽE

Šarža: {číslo}

5. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

1. MENO A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Bioveta, a. s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

TOP SPOT ON DOG S, roztok na nakvapkanie na kožu – spot-on pre psy

Permethrinum

3. ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY

1 aplikátor (1 ml) roztoku obsahuje:

Liečivá látka

Permethrinum 650 mg

Pomocné látky

Butylhydroxyanisol (E320) 0,2 mg

Žltkastý, číry roztok na nakvapkanie na kožu – spot-on

4. INDIKÁCIA

Liečebné a preventívne použitie u psov proti ektoparazitom – bľchám a kliešťom.

5. KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívať u mačiek, liek je pre ne toxický! (piktogram – preškrtnutá mačka)

Nepoužívať u šteniat mladších ako 3 týždne. Nepoužívať u šteniat a psov s hmotnosťou nižšou ako 2 kg.

Nepoužívať v prípade precitlivelosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.

6. NEŽIADUCE ÚČINKY

V mieste aplikácie môže prísť k prechodnému podráždeniu kože. V týchto prípadoch opláchnite zviera vodou a chráňte ho pred prechladnutím. V prípade pretrvávajúcich nežiaducich účinkov vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte vášho veterinárneho lekára.

7. CIEĽOVÝ DRUH ZVIERAT

Psy (do 15 kg).

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA

Len na podanie nakvapkaním na kožu – spot-on.

Psy do 15 kg – obsah aplikátora (1 ml) sa nanesie na kožu v oblasti medzi lopatkami pri psoch malých plemien.

Spôsob podania:

Aplikátor držte hrdlom hore a niekoľkokrát poklepte na hrdlo prstom. Opatrne odlomte špic krúživým pohybom. Rozhrňte srst' zvieraťa v chrbtovom hrbole pred lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Hrot nástavca priložte na kožu a niekoľkokrát stisnite aplikátor tak, aby sa celý obsah aplikátora vyprázdnil priamo na kožu. Nevtierať.

9. POKYNY NA SPRÁVNE PODANIE

Ak psy po ošetrení premoknú alebo sú šampónovaní, je nutné ošetrenie opakovať. Interval medzi jednotlivými ošetreniami by mal byť najmenej 7 dní.

10. OCHRANNÁ LEHOTA

Nie je určené na potravinové zvieratá.

11. OSOBITNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dosahu detí.

Uchovávať pri teplote do 25°C, chrániť pred svetlom.
Chrániť pred chladom a mrazom.

Nepoužívať po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na obale.
Po otvorení vrecka ihneď spotrebujte.

12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA

< Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:>

Tento liek je extrémne jedovatý pre mačky a jeho podanie mačkám môže viesť až k ich úhynu z dôvodu špecifickej fyziológie mačiek, ktoré nie sú schopné metabolizovať určité látky vrátane permethrínu. Aby sa zabránilo náhodnému kontaktu mačiek s liekom, udržiajte psy po ošetrení oddelene od mačiek, až kým nie je miesto aplikácie suché. Je potrebné zabezpečiť česanie psov, ktorým bol v posledných 48 hodinách aplikovaný tento liek a mačiek odlišnou kefou, z dôvodu možnej toxicity takto prenesenej látky pre mačky. Pri náhodnom použití tej istej kefy vyhľadajte v prípade zmien správania mačky veterinárneho lekára.

Presne dodržiavajte vhodnú veľkosť balenia. Pre malé psy, psy malých plemien, je kontraindikované podanie lieku Top spot on Dog M alebo Top spot on Dog L. Pre stredne veľké psy, psy stredných plemien, je kontraindikované podanie lieku Top spot on Dog L.

Po aplikácii sa odporúča počas 12 – 24 hod. obmedziť manipuláciu so zvieratami. Neodporúča sa ich pohyb na slnku. Po ošetrení sa neodporúča počas 12 hodín kúpanie zvierat. Šampónovaním môže byť negatívne ovplyvnená dĺžka ochranného účinku.

Rezistencia parazitov voči ktorejkoľvek skupine ektoparazitík sa môže vyvinúť po častom, opakovanom použití ektoparazitika z rovnakej skupiny, s rovnakým spôsobom účinku.

Liek aplikovať len na povrch kože. Neaplikovať perorálne alebo parenterálne. Vyhnúť sa podaniu lieku na sliznice (do očí, nozdier, na sliznice genitálií a do miest poranenia kože). Je dôležité zaistiť aplikáciu lieku na určené miesto a po aplikácii zabrániť olizovaniu miesta podania i vzájomnému olizovaniu zvierat. V ojedinelých prípadoch pri zvlášť citlivých jedincoch môže dôjsť k prechodnému podráždeniu kože v mieste aplikácie. V týchto prípadoch opláchnite zviera vodou. Vzhľadom na možnosť zamorenia miesta pobytu zvierat blchami, je nutná pravidelná asanácia prostredia vhodným insekticídum.

< Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:>

Počas aplikácie lieku nejedzte, nepite, ani nefajčite.

Liek pôsobí dráždivo na dýchací trakt. Zabráňte kontaktu lieku s kožou a očami.

V prípade náhodného znečistenia kože okamžite umyte zasiahnuté miesto vodou a mydlom.

V prípade náhodného kontaktu lieku s očami, ich dôkladne vypláchnite vodou.

Ak podráždenie kože alebo očí pretrváva, alebo ak je veterinárny liek náhodne prehltnutý, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu alebo etiketu praktickému lekárovi.

Ľudia so známou precitlivosťou na permethrín by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto veterinárnym liekom.

Po použití si umyte ruky.

Nemanipulujte s ošetrenými zvieratami a zamedzte deťom hrať sa s nimi, až kým nezaschne miesto aplikácie a to najmenej 24 hodín po aplikácii. Odporúča sa preto neošetrovať zvieratá počas dňa, ale v podvečer, a nedovoľiť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, predovšetkým s deťmi.

Ďalšie opatrenia

Liek môže mať nežiaduce účinky na vodné živočíchy.

Ošetreným psom zamedziť prístup k vodným tokom a vodným zdrojom počas 2 dní po ošetrení.

Gravidita a laktácia: Liek nemá vplyv na graviditu a laktáciu.

Interakcia: Nepoužívajte tento liek v kombinácii s inými insekticídnymi ektoparazitikami.

Predávkovanie: Pri predávkovaní môže dôjsť k lokálnemu podráždeniu kože, zmene citlivosti až znecitliveniu, svrbeniu, brneniu a páleniu. Ak dôjde k vstreknutiu účinnej látky do oka, môže vyvolať slzenie a prechodnú konjunktivitídu. Liek pôsobí dráždivo na dýchací trakt. Môže sa objaviť kašeľ, kýchanie a výtok z nosa. Po prehltnutí účinnej látky dochádza k bolestiam v krku, ktoré sú sprevádzané nauzeou, zvracaním a abdominálnou bolesťou. V dutine ústnej môžu byť prítomné ulcerácie a sekrécia slín je zvýšená. Systémové príznaky sa objavia o 4–48 hodín po expozícii (závrate, bolesti hlavy a únava, palpácia srdca, bolesť na hrudi, zastrený zrak). Kóma a kŕče sú život ohrozujúce stavy.

V prípade náhodného zasiahnutia oka, opatrne vypláchnite oko čistou vodou. Pokiaľ liek pôsobí dráždivo v mieste aplikácie, opláchnite zviera čistou vodou. Ak sa objavia systémové príznaky, vyhľadajte veterinárneho lekára.

Spôsob účinku

Mechanizmus účinku permethrínu je založený na ovplyvnení iónových kanálov nervových vlákien parazitov. Pôsobí proti ektoparazitom adulticídne. Vehikulum zaisťuje depotný účinok lieku.

Jedna odporúčaná dávka lieku TOP SPOT ON DOG S zaisťuje ochranu proti napadnutiu kliešťami až na 4 týždne a proti napadnutiu blchami až na 3 mesiace.

13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Tento liek nesmie kontaminovať vodné toky, pretože môže byť nebezpečný pre ryby a ďalšie vodné organizmy. Nekontaminujte rybníky, vodné toky alebo stoky liekom alebo prázdnyimi obalmi.

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍ SOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Len pre zvieratá.

Veľkosti balenia 3x1 ml a 10x1 ml: Výdaj lieku **je** viazaný na veterinárny predpis.

Veľkosť balenia 1x1 ml: Výdaj lieku **nie je** viazaný na veterinárny predpis.

Veľkosti balenia: 1, 3 alebo 10 aplikátorov.

Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.